

Anexo 23		
<b>Práticas de Mercado : Auditando Materiais Descartáveis</b>		
<b>Fator de Análise</b>	<b>Tópico</b>	<b>Notas</b>
Controles auxiliares de evidência	Consistência	Quantidade compatível com a necessidade
		Quantidades anormais justificadas nos registros de evolução
Controles auxiliares de evidência	Atenção básica	Apontamento através de kits:  Desejável quando o consumo no procedimento é standard (sem grandes variações) Requer atenção em relação a forma como o lançamento do kit é feito: processo mecanico de lançamento sem evidência de utilização
O que se espera do processo de auditoria	Auditor Interno e Externo	Aferir se o lançamento é coerente com as regras contratuais
	Auditor Externo	Glosar apontamentos indevidos
	Auditor Interno	Identificar consumos que não foram lançados e: Endereçar para que sejam apontados Liderar o processo de melhoria contínua do desenvolvimento de kits
Não pode ser cobrados	Descartáveis que não são utilizados na atenção direta do paciente específico. Exemplos:	Materiais utilizados para proteção da equipe de enfermagem ( EPI – Equipamento de Proteção Individual )
		Materiais contaminados na execução de atividade de supervisão ou rotina departamental (staff), mesmo que pelo médico ou qualquer outro profissional assistencial. Exemplos:  CCIH SADT Chefe de Área Responsável pela Ala
		Materiais utilizados para higiene e assepsia da unidade (para isso existem as taxas)

Anexo 23		
<b>Práticas de Mercado : Auditando Materiais Descartáveis</b>		
<b>Fator de Análise</b>	<b>Tópico</b>	<b>Notas</b>
Pode ser cobrados	Todo material utilizado na atenção direta ao paciente que não esteja incluído em outro lançamento da conta (diária, taxa, kit ...). Exemplos:	<p>Materiais utilizados para isolamento reverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gorro</li> <li>Máscara</li> <li>Luva</li> <li>Avental</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">Observando quantidades estabelecidas por plantão</p>
		<p>Materiais utilizados para higiene do paciente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Absorvente higiênico feminino nos procedimentos ginecológicos ou obstétricos</li> <li>Fralda ou fraldão</li> </ul> <p style="padding-left: 40px;">Quando prescrito e indicado</p>
		<p>Catéteres para punção venosa periférica</p> <p style="padding-left: 20px;">Tipo jelco, abbocth, scalp ...</p>
		<p>Equipo</p> <p style="padding-left: 20px;">Para infusão conforme padrões da CCIH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unidade de Internação – 1 para cada 48 horas</li> <li>UTI – 1 para cada 24 horas</li> </ul> <p style="padding-left: 20px;">Utilizado em bomba de infusão</p> <p style="padding-left: 40px;">1 para cada 24 horas – por droga</p> <p style="padding-left: 20px;">Quando indicado na infusão rápida de soluções diluídas</p> <p style="padding-left: 20px;">Micro-gotas quando indicado na diluição de antibióticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Em pediatria</li> <li>Para hidratação</li> </ul> <p style="padding-left: 20px;">Atenção complementar no processo de auditoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Compatibilidade do equipo com a marca da bomba</li> <li>Utilizado em regime de urgência deve constar na prescrição ou evolução da enfermagem ou do profissional de apoio multidisciplinar</li> </ul>